


3




4


## くすりのしおり

615101300


2008年2月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
<b>商品名：三和八味地黄丸料エキス細粒</b> 主成分：八味地黄丸料（Hachimijiogan） 剤形：かっ色の細粒 シート記載：アルミ分包 S-04 三和 八味地黄丸料 3.0g	
<b>この薬の作用と効果について</b> この薬は漢方薬です。あなたの症状や体質に合わせて処方してあります。 下腹部が軟弱で、足腰が冷えて痛み、何度もトイレに通ったり、または尿が出にくく残尿感がある人などやむくみがあるような人に用いられます。 通常、老化により新陳代謝の衰えのある人の、慢性腎炎、糖尿病、水腫、脚気のむくみ、膀胱カタル、腰痛、五十肩、肩こりなどの治療に用いられます。	
<b>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。</li> <li>・ 妊娠または授乳中</li> <li>・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。</li> </ul>	
<b>用法・用量（この薬の使い方）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>あなたの用法・用量は</b> <span style="float: right;">：医療担当者記入</span> <b>《</b></li> <li>・ 通常、成人は1回3gを1日3回食前または食間に服用します。年齢、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。</li> <li>・ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間まで近い場合は飲まないで、その後は指示された時間から飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。</li> <li>・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。</li> <li>・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。</li> </ul>	
<b>生活上の注意</b>	
<b>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）</b> 主な副作用として、発疹、発赤、かゆみ、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘、体がだるい、どろき、のぼせ、舌のしびれなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 <b>まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。</b> <b>このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</b> 該当する記載事項はありません。 <b>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</b>	
<b>保管方法その他</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避け、湿気の少ないところに保管してください。</li> <li>・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。</li> </ul>	
<b>医療担当者記入欄</b> 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。



2



1

SPコード