

はんげこうぼくとう  
**半夏厚朴湯 A エキス錠 三和生薬**

半夏厚朴湯Aエキス錠 三和生薬は、漢方処方「半夏厚朴湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたもので



## 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成 分

本品1日量 ..... 18錠（1錠0.35g）中  
半夏厚朴湯エキス ..... 2.6g

ハ ン ゲ	..... 6 g
ブクリヨウ	..... 5 g
ショウキヨウ	..... 1 g
コウボク	..... 3 g
ソ ヨ ウ	..... 2 g

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、カルメロースCa、カルメロース、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

## 適応症

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しづがれ声、などのつかえ感

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

## 〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店

又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1