

貯法：室温保存
有効期間：5 年

生薬製剤

ST-01

日本標準商品分類番号

875900

承認番号

14000AZZ03987000

販売開始

1967 年 7 月

加工ブシ末製剤
アコニンサン錠

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	アコニンサン錠
有効成分	1 錠中 ^{注 1)} 日局 加工ブシ末(ブシ末 1 ^{注 2)}) 166.67mg
添加剤	乳糖水和物又はトウモロコシデンプン

注 1) アコニンサン錠 9 錠(1 日量)は、加工ブシ末 1.5 g に相当する

注 2) ブシ末 1：高圧蒸気処理により加工

3.2 製剤の性状

剤形	錠剤					
色	淡褐色					
におい	特異な芳香					
味	苦い					
識別コード	ST-01					
形状	表面		裏面		側面	
直径	8.0 mm					
厚さ	4.0 mm					
質量	200 mg					

4. 効能又は効果

鎮痛、強心、利尿

6. 用法及び用量

通常、成人 1 日量 9 錠を 1 日 3 回に分服する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

9.1.2 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
そ の 他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

19. 有効成分に関する理化学的知見

含有される化合物

日局加工ブシ末は、ハナトリカブトならびにオクトリカブトの塊根を加工処理して毒性を減じたものである。成分として、メサコニチン、ベンゾイルメサコニン、14-アニソイルアコニン等が含まれる。

20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

252錠(3錠×84包) [分包]
900錠(3錠×300包) [分包]
1,000錠 [ボトル]

*24. 文献請求先及び問い合わせ先

三和生薬株式会社 お客様相談窓口
〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1
ナビダイヤル：0570-095770 FAX：028-661-2410

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1