

**2011年8月改訂(第3版)

*2008年8月改訂

漢方製剤
三和 半夏厚朴湯 エキス細粒
半夏厚朴湯

日本標準商品分類番号	875200
承認番号	61AM第3627
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

貯法・取扱い上の注意

吸湿しやすいので、使用後は密栓し、直射日光を避け涼しいところに保管すること。

使用期限

ラベル又は外箱に表示。

本品は金匱要略に記載されている「半夏厚朴湯」の水製エキスを細粒剤にした服用しやすい製剤である。

S-13

【組成】

本品1日量(4.5g)中、下記の日局半夏厚朴湯エキス2.6gを含有する。

日局	ハンゲ	6.0g	日局	コウボク	3.0g
日局	ブクリョウ	5.0g	日局	ソヨウ	2.0g
日局	ショウキョウ	1.0g			

*添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸を含有する。

【性状】

本品はかっ色の細粒で、特異な芳香を有し、味は辛く、やや苦い。

【効能又は効果】

精神不安があつて咽喉から胸もとにかけて、ふさがりような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うものの次の諸症

気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嘔声、胃神経症、更年期神経症、神経性咽頭痛、ノイローゼ

【用法及び用量】

通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

**2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、痒痒等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量する等注意すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少くない。]

【包装】 500g、1.5g×300包



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6番地1

UH