

貯法：室温保存
有効期間：5年

漢方製剤

S-25

日本標準商品分類番号

875200

承認番号	16100AMZ03617000
販売開始	1986年11月

じゅうみはいどくとう 三和十味敗毒湯エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	三和十味敗毒湯エキス細粒	
有効成分	本品1日量(7.5g)中、下記の十味敗毒湯水製エキス3.7gを含有する。 日局 サイコ 3.0 g 日局 ブクリョウ 3.0 g 日局 オウヒ 3.0 g 日局 ドクカツ 1.5 g 日局 キキョウ 3.0 g 日局 ハマボウフウ 1.5 g 日局 ショウキヨウ 1.0 g 日局 カンゾウ 1.0 g 日局 センキュウ 3.0 g 日局 ケイガイ 1.0 g	
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸	

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色	褐色
におい	特異な芳香
味	甘く、やや辛い
識別コード	S-25

4. 効能又は効果

比較的神經質で胸脇苦満があり癪、アレルギー性の湿疹などを起しやすい体質のものの次の諸症
皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、乳房炎、フルンクロージスの体質改善、腫物、尋常性痤瘡、とびひ

6. 用法及び用量

通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2参照]
8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 著しく体力の衰えている患者

皮膚症状が悪化するおそれがある。

9.1.2 著しく胃腸の虚弱な患者

食欲不振、胃部不快感、恶心、下痢等があらわれるおそれがある。

9.1.3 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者

これらの症状が悪化するおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益気湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-시스ティン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等 [8.2、11.1.1、11.1.2参照]	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、下痢等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿氣を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500 g [ボトル]
2.5 g × 300包 [分包]

* 24. 文献請求先及び問い合わせ先

三和生薬株式会社 お客様相談窓口
〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1
ナビダイヤル : 0570-095770 FAX : 028-661-2410

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1