*2025年10月改訂(第2版) 2022年9月改訂(第1版)

貯法:室温保存 **有効期間**:5年

漢方製剤

日本標準商品分類番号

S-21

承認番号	16100AMZ03609000
販売開始	1986年11月

ラッくんしとう 三和六君子湯エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	三和六君子湯エキス細粒
有効成分	本品 1 日量 (7.5g) 中、下記の日局六君子湯エキス
	4.9gを含有する。
	日局 ニンジン 4.0g 日局 チンピ 2.0g
	日局 ビャクジュツ 4.0g 日局 ショウキョウ 0.5g
	日局 ブクリョウ 4.0g 日局 タイソウ 2.0g
	日局 ハンゲ 4.0g 日局 カンゾウ 1.0g
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、
	部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色	黄褐色
におい	特異な芳香
味	甘く、辛い
識別コード	S-21

4. 効能又は効果

胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、 貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症:

胃炎、胃アトニ―、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

6. 用法及び用量

通常、成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血 圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2参照]
- 8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性 が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症	グリチルリチ
芍薬甘草湯	があらわれやすくな	ン酸は尿細管
補中益気湯	る。また、低カリウム	でのカリウム
抑肝散 等	血症の結果として、	排泄促進作用
グリチルリチン酸及びその	ミオパチーがあらわ	があるため、血
塩類を含有する製剤	れやすくなる。	清カリウム値
グリチルリチン酸一アン		の低下が促進
モニウム・グリシン・L-		されることが
システイン		考えられる。
グリチルリチン酸一アン		
モニウム・グリシン・DL-		
メチオニン配合錠 等		
[8.2、11.1.1、11.1.2参照]		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を 行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 **偽アルドステロン症**(頻度不明)

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.1.2 ミオパチー (頻度不明)

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.1.3 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST、ALT、Al-P、 γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

			頻度不明		
過	敏	症	発疹、蕁麻疹等		
消	化	器	悪心、腹部膨満感、下痢等		

20. 取扱い上の注意

- **20.1** 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光 の当たらない涼しい所に保管すること。
- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g [ボトル] 2.5g×300包[分包]

*24. 文献請求先及び問い合わせ先

三和生薬株式会社 お客様相談窓口 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1 ナビダイヤル:0570-095770 FAX:028-661-2410

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



三和生薬株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1