

＊2025 年 10 月改訂（第 2 版）
2022 年 9 月改訂（第 1 版）

貯法：室温保存
有効期間：5 年

漢方製剤

S-16

日本標準商品分類番号
875200

承認番号	16100AMZ03621000
販売開始	1986 年 11 月

三和苓桂朮甘湯エキス細粒

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	三和苓桂朮甘湯エキス細粒
有効成分	本品 1 日量（4.5 g）中、下記の日局苓桂朮甘湯エキス 1.7 g を含有する。 日局 ブクリョウ 6.0 g 日局 ビャクジュツ 3.0 g 日局 ケイヒ 4.0 g 日局 カンゾウ 2.0 g
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色	褐色
におい	特異な芳香
味	苦く、甘い
識別コード	S-16

4. 効能又は効果

頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進など
があって不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるもの
の次の諸症
神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニ
エル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患

6. 用法及び用量

通常、成人 1 日 4.5 g を 3 回に分割し、食前又は食間に経口投与
する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮
して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見
の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血
圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2参照]
- 8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意す
ること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性
が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又
は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益気湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその 塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アン モニウム・グリシン・L- システイン グリチルリチン酸一アン モニウム・グリシン・DL- メチオニン配合錠 等 [8.2、11.1.1、11.1.2 参照]	偽アルドステロン症 があらわれやすくな る。また、低カリウム 血症の結果として、 ミオパチーがあらわ れやすくなる。	グリチルリチ ン酸は尿細管 でのカリウム 排泄促進作用 があるため、血 清カリウム値 の低下が促進 されることが 考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を
行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、
体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるの
で、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が
認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切
な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあ
るので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常
が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適
切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症	発疹、発赤、痒痒等

20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光
の当たらない涼しい所に保管すること。
- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることが
ある。

22. 包装

- 500 g [ボトル]
1.5 g × 300 包 [分包]

***24. 文献請求先及び問い合わせ先**

三和生薬株式会社 お客様相談窓口

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

ナビダイヤル：0570-095770 FAX：028-661-2410

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1