

ぼうふうつうしょうさんりょう
防風通聖散料 A エキス細粒 三和生薬

防風通聖散料Aエキス細粒 三和生薬は、漢方処方「防風通聖散」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたもので



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 医師の治療を受けている人。
- 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 発汗傾向の著しい人。
- 高齢者。
- 今まで薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。
- 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘

- 1ヶ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：

高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
4才未満	服用しないこと

用法・用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

*成 分

本品 1 日量 6.0 g 中
防風通聖散エキス (7/10量) 4.0 g

トウキ	0.84 g	マオウ	0.84 g
シャクヤク	0.84 g	ダイオウ	1.05 g
センキュウ	0.84 g	無水ボウショウ	0.525g
サンシシ	0.84 g	キキョウ	1.40 g
レンギョウ	0.84 g	ビャクジユツ	1.40 g
ハッカ	0.84 g	カンゾウ	1.40 g
ショウキョウ	0.21 g	オウゴン	1.40 g
ケイガイ	0.84 g	セッコウ	1.40 g
ハマボウフウ	0.84 g	カッセキ	2.10 g

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもあります、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1