

サンワ ぼう い おう ぎ と う
防己黄耆湯 エキス細粒「分包」

サンワ防己黄耆湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「防己黄耆湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

*成 分

本品1日量 …… 3包（1包2g）中
防己黄耆湯エキス（3/5量） …… 2.0g

ボ ウ イ …… 3.0g	ショウキョウ …… 0.6g
オ ウ ギ …… 3.0g	タイソウ …… 1.8g
ソウジュツ …… 1.8g	カンゾウ …… 0.9g
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- *（4）1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
T E L 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：

肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1