

ぼういおうぎとう  
**サンワ 防已黃耆湯 エキス細粒**

サンワ防已黃耆湯エキス細粒は、漢方処方「防已黃耆湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたもので



### 使用上の注意



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 医師の治療を受けている人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

##### 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 適応症

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：

肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年令	1回量
大人(15才以上)	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
4才未満	服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 成 分

本品1日量 ..... 6 g 中  
 防已黃耆湯エキス(3/5量) ..... 2.0 g

ボウイ ..... 3.0 g	ショウキョウ ..... 0.6 g
オウギ ..... 3.0 g	タイソウ ..... 1.8 g
ソウジュツ ..... 1.8 g	カンゾウ ..... 0.9 g

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社  
 栃木県宇都宮市平出工業団地6-1