2012年9月改訂（記載要領変更による）

第２類医薬品

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 137

サンワ　排膿散料（はいのうさんりょう）　エキス細粒

サンワ排膿散料エキス細粒は、漢方処方「排膿散」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。

使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師、歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
消 化 器	胃部不快感

3．５～６日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成　分

本品１日量 ……　６ｇ 中
排膿散料水製エキス ……　1.3ｇ

（
キ ジ ツ ……　3ｇ
シャクヤク ……　3ｇ
キキョウ ……　1ｇ
）

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：
化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社　消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
ＴＥＬ　03-3834-2171（代）
（月～金曜日　10：00～17：00　但し祝日を除く）

用法・用量

次の１回量を１日３回食前又は食間に服用すること。

年　　令	１ 回　量
大人（１５才以上）	2.0 ｇ
７才～１４才	1.3 ｇ
４才～　６才	1.0 ｇ
４才　未　満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

CI