

はい のう さんりょう サンワ 排膿散料 エキス細粒「分包」

サンワ排膿散料エキス細粒「分包」は、漢方処方「排膿散」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師、歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	胃部不快感

3. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …… 3 包（1 包 2 g）中
排膿散料水製エキス …… 1.3 g

キ ジ ツ ……	3 g
シャクヤク ……	3 g
キキョウ ……	1 g
＊上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- ＊(4) 1 包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

適応症

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：
化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1