

葛 根 湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

葛根湯 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「葛根湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1 ヶ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には 5～6 回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 2.0 g）中
葛根湯エキス …………… 4.1 g

カッコン …………… 4 g	シャクヤク …………… 2 g
マ オ ウ …………… 3 g	タイソウ …………… 3 g
ケ イ ヒ …………… 2 g	ショウキョウ …… 1 g
カンゾウ …………… 2 g	

*上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- * 1 包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
T E L 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

適応症

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 304

Revised : August 2018

Category 2 OTC medicines

Kakkonto A Extract Fine Granules [packets] SANWASHOYAKU

This product is easy to take, fine granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called “kakkonto”.

CAUTION FOR USE

Who should seek consultation

1. The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.
 - (1) Persons undergoing medical treatment from a physician.
 - (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - (3) Persons who is physically weak (declining of strength or constitutional weakness).
 - (4) Persons who have gastrointestinal weakness.
 - (5) Persons with excessive sweating.
 - (6) Elderly persons.
 - (7) Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.
 - (8) Persons with the following symptoms: edema, difficulty in urination.
 - (9) Persons diagnosed as having the following: hypertension, heart disease, kidney disease, thyroid disease.
2. The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching
Gastrointestinal system	Nausea, loss of appetite, gastric distress

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

Symptoms' name	Symptoms
Pseudoaldosteronism, myopathy	In addition to listlessness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually worsen.
Hepatic function failure	Following symptoms appear: fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and white of eyes), brown urine, whole-body tiredness, loss of appetite.

3. Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for about 1 month (5 to 6 times if you take this medicine for in the case of the initial stage of the common cold, coryza, and headache). Take this leaflet with you.
4. If you take this medicine regularly for a long periods, consult a physician, pharmacist or registered distributor.

INDICATIONS

Following symptoms in person with moderate or more physical strength:

Initial stage of common cold (without spontaneous sweating), coryza, rhinitis, headache, shoulder stiffness, muscle pain, and pain in hands and shoulder.

DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or between meals.

Age	One dosage
Adult (15 years and over)	1 packet
7 - 14 years	2/3 packet
4 - 6 years	1/2 packet
Less than 4 years	Do not use

<Cautions>

This medication should be given to children only under adult supervision

INGREDIENTS

3 packets (2.0g/packet) of **Kakkonto A Extract Fine Granules** contain 4.1g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Pueraria Root4g
JP Ephedra Herb3g
JP Cinnamon Bark2g
JP Glycyrrhiza2g
JP Peony Root2g
JP Jujube3g
JP Ginger1g

Inactive ingredients

JP Lactose Hydrate, JP Microcrystalline Cellulose, Partly Pregeatinized Starch, JP Calcium Stearate, JP Light Anhydrous Silicic Acid.

(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- (1) Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- (2) Keep all medication out of the reach of children.
- (3) Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- (4) When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

CONTACT INFORMATION

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Tel : 03-3834-2171
(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.

Manufactured and Distributed by:

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.
6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan