

サンワ <sup>かん</sup> <sup>ぞう</sup> <sup>とう</sup> 甘草湯 エキス細粒「分包」

サンワ甘草湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「甘草湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。  
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日2回食前又は食間に少しずつゆっくり服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
2才～3才	1/3 包
2才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 2包(1包 1g)中  
甘草湯水製エキス …………… 0.9g

〔カンゾウ…………… 4.0 g〕  
\*上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸Ca、カルメロースCa、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- \* (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田6-6-1  
TEL 03-3834-2171 (代)  
(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

適応症

激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声

〈適応症に関連する注意〉

体力に関わらず、使用できる。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1