

けいがいれんぎょうとう
サンワ 荊芥連翹湯 エキス細粒

サンワ荊芥連翹湯エキス細粒は、漢方処方「荊芥連翹湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたり すると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが 急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や 白目が黄色くなる）、褐色尿、全身の だるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品1日量 …………… 6 g 中
 荊芥連翹湯水製エキス … 1.9 g

トウキ………… 0.9 g	キジツ………… 0.9 g
シヤクヤク………… 0.9 g	オウゴン………… 0.9 g
ケイガイ………… 0.9 g	サンシシ………… 0.9 g
レンギョウ………… 0.9 g	ビヤクシ………… 0.9 g
ハマボウフウ… 0.9 g	キキョウ………… 0.9 g
センキュウ………… 0.9 g	カンゾウ………… 0.6 g
サイコ………… 0.9 g	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して
保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり
品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
 東京都千代田区外神田6-6-1
 TEL 03-3834-2171（代）
 （月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗
をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：
 蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま
せん。



三和生薬株式会社
 栃木県宇都宮市平出工業団地6-1