

けい し か かつ こんとう
サンワ 桂枝加葛根湯 エキス細粒「分包」

サンワ桂枝加葛根湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「桂枝加葛根湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
 その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令 | 1 回 量 |
|-----------|---------|
| 大人(15才以上) | 1 包 |
| 7才～14才 | 2/3 包 |
| 4才～6才 | 1/2 包 |
| 4才未満 | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… 3包(1包2g)中
 桂枝加葛根湯水製エキス …… 2.3g

| | |
|-----------------|------|
| ケイヒ | 2.4g |
| シャクヤク | 2.4g |
| タイソウ | 2.4g |
| ショウキョウ | 0.6g |
| カンゾウ | 1.2g |
| カッコン | 3.6g |
| *上記の生薬より抽出したエキス | |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- *1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● **お問い合わせ先**

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
 東京都千代田区外神田 6-6-1
 TEL 03-3834-2171 (代)
 (月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

適応症

体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状:

かぜの初期

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1