

けいしかりゅうこつぼれいとう
サンワ 桂枝加竜骨牡蛎湯 エキス錠

サンワ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス錠は、漢方処方「桂枝加竜骨牡蛎湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱 力感、筋肉痛があらわれ、徐々 に強くなる。

- 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用して
も症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談
すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 18錠（1錠 0.3g） 中
桂枝加竜骨牡蛎湯水製エキス …… 2.1g

ケイヒ	2.4g
シヤクヤク	2.4g
カンゾウ	1.2g
ショウキョウ	0.6g
タイソウ	2.4g
リュウコツ	1.8g
ボレイ	1.8g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、メタケイ酸
アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、カルメロースCaを
含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して
保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり
品質が変わる。）
- 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないよう
にすること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
TEL 03-3834-2171 (代)
(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

適応症

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいも
の次の諸症：

神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま
せん。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1