

けい し か しゃくやくとう
サンワ 桂枝加芍薬湯 エキス錠

サンワ桂枝加芍薬湯エキス錠は、漢方処方「桂枝加芍薬湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1 週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	6 錠
7 才～14 才	4 錠
5 才～ 6 才	3 錠
5 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 18 錠（1 錠 0.3 g）中
桂枝加芍薬湯水製エキス …… 2.0 g

ケ イ ヒ……………	2.4 g
ショウキョウ……………	0.6 g
タイソウ……………	2.4 g
カンゾウ……………	1.2 g
シャクヤク……………	3.6 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、カルメロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
T E L 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症：
しぶり腹^{注)}、腹痛、下痢、便秘

〈適応症に関連する注意〉

注)：しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1