

# サンワ けい し とう 桂枝湯 エキス細粒「分包」

サンワ桂枝湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「桂枝湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

#### 3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4才未満	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成 分

本品1日量 …………… 3包(1包 2g) 中  
桂枝湯水製エキス …………… 2.3g

ケイヒ	3.2g
シヤクヤク	3.2g
タイソウ	3.2g
ショウキョウ	0.8g
カンゾウ	1.6g
*上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- \* (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせをお願いします。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
TEL 03-3834-2171 (代)  
(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

## 適応症

体力虚弱で、汗が出るものの次の症状：  
かぜの初期

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1