

りっくん し とう 六君子湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

六君子湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「六君子湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品1日量 …………… 3包（1包2.0 g）中
六君子湯エキス（4/5量）…………… 3.9 g

ニンジン …………… 3.2 g	チ ン ピ …………… 1.6 g
ビャクジュツ …… 3.2 g	ショウキョウ …… 0.4 g
ブクリョウ …… 3.2 g	タイソウ …………… 1.6 g
ハ ン ゲ …………… 3.2 g	カンゾウ …………… 0.8 g

*上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- * (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田6-6-1
TEL 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 324

Revised : March 2018

Category 2 OTC medicines

Rikkunshito A Extract Fine Granules [packets] SANWASHOYAKU

This product is easy to take, fine granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called “rikkunshito”.

CAUTION FOR USE

Who should seek consultation

- The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.
 - Persons undergoing medical treatment from a physician.
 - Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.
- The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

Symptoms' name	Symptoms
Hepatic function failure	Following symptoms appear: fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and white of eyes), brown urine, whole-body tiredness, loss of appetite.

- Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for about 1 month. Take this leaflet with you.

INDICATIONS

Following symptoms in persons with moderate or poor physical strength who complaint gastrointestinal weakness, loss of appetite, difficulty of swallowing at the solar plexus, easy fatigability, anemia, and over-sensitivity to cold of hands and feet:

Gastritis, gastrointestinal weakness, gastric ptosis, dyspepsia, loss of appetite, gastric pain, and vomiting.

DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or between meals.

Age	One dosage
Adult(15 years and over)	1 packet
7 - 14 years	2/3 packet
4 - 6 years	1/2 packet
Less than 4 years	Do not use

<Cautions >

This medication should be given to children only under adult supervision

INGREDIENTS

3 packets (2.0g/packet) of **Rikkunshito A Extract Fine Granules** contain 3.9g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Ginseng3.2g
JP Atractylodes Rhizome3.2g
JP Poria Sclerotium3.2g
JP Pinellia Tuber3.2g
JP Citrus Unshiu Peel1.6g
JP Ginger0.4g
JP Jujube1.6g
JP Glycyrrhiza0.8g

Inactive ingredients

JP Lactose Hydrate, JP Microcrystalline Cellulose, Partly prege-latinized Starch, JP Calcium Stearate, JP Light Anhydrous Silicic Acid.

(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- Keep all medication out of the reach of children.
- Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

CONTACT INFORMATION

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Tel : 03-3834-2171
(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.
--

Manufactured and Distributed by:

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.
6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan