

ご使用に際しては、説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

りっくん し とう
六君子湯 A エキス錠 三和生薬

品番 324

六君子湯Aエキス錠 三和生薬は、漢方処方「六君子湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食 欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15才以上)	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… 18錠 (1錠0.35g) 中
六君子湯エキス (3/5量) …… 2.9g

ニンジン	2.4g	チンピ	1.2g
ビャクジュツ	2.4g	シヨウキヨウ	0.3g
ブクリョウ	2.4g	タイソウ	1.2g
ハンゲ	2.4g	カンゾウ	0.6g

*上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、カルメロースCa、カルメロース、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

*消費者くすり相談室

TEL 0570-095770

10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1