

# ロク ジ ョ ン

ろくじょうたい ほ とう  
鹿茸大補湯 による

ロクジンは、漢方処方「鹿茸大補湯」のエキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

#### 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成 分

本品1日量 …… 18錠 (1錠 0.3g) 中

〔ロクジョウ …… 0.576g〕  
〔ニンジン …… 0.72g〕

上記の生薬より抽出したアルコール製エキス …… 0.432g

〔ニクジュヨウ … 0.576g    ゴミシ …… 0.432g  
 ジュクジオウ … 0.576g    ハ ン ゲ …… 0.432g  
 トチュウ …… 0.576g    オ ウ ギ …… 0.432g  
 シャクヤク …… 0.576g    ブクリョウ …… 0.432g  
 ビャクジュツ … 0.576g    タイソウ …… 0.432g  
 ト ウ キ …… 0.576g    カンゾウ …… 0.432g  
 セッコク …… 0.432g    ショウキョウ … 0.288g  
 上記の生薬より抽出した水製エキス … 2.592g  
 加工ブシ末 …… 0.576g〕

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、トウモロコシデンプン含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

## 適応症

身体が衰弱し、やせて皮膚が乾燥して貧血食慾不振を呈するもの。

補血・健胃強壮・食慾増進・疲労回復・神経痛・関節炎・肩こり・冷症。

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15才以上)	6 錠
15才 未 満	服用しないこと

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1