

サンワロンC 顆粒

かっこん かじゅつぶ とう
葛根加朮附湯による

サンワロンC顆粒は、漢方処方「葛根加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1~3包
15才未満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …… 9包(1包0.8g) 中
サンワロンC水製エキス …… 3.375g

カッコン……………	4.500g	ソウジュツ……………	3.375g
マオウ……………	3.375g	ケイヒ……………	2.250g
ショウキョウ…	3.375g	シャクヤク……………	2.250g
タイソウ……………	3.375g	カンゾウ……………	2.250g

*上記の生薬より抽出したエキス

加工ブシ末 …… 1.125g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- * (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田6-6-1
TEL 03-3834-2171 (代)
(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

*適応症

悪寒発熱して頭痛があり、項部、肩背部に緊張感あるもの。
肩こり・肩甲部の神経痛・上半身の関節リウマチ。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 107

Revised : March 2018

Category②OTC medicines

Sanwaron C Granules

<Kakkonkajutsubuto>

This product is easy to take, granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called "kakkonkajutsubuto".

CAUTION FOR USE

Who should seek consultation

- The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.
 - Persons undergoing medical treatment from a physician.
 - Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - Persons with extremely weak stomach and intestine.
 - Persons with excessive sweating.
 - Persons with a tendency towards hot flush, red face and strong constitution.
 - Elderly persons.
 - Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.
 - Persons with the following symptoms: edema, dysuria.
 - Persons diagnosed as having the following: hypertension, heart disease, kidney disease, thyroid disease.

- The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching
Gastrointestinal system	Nausea, loss of appetite, gastric distress
Others	Palpitation, rush of blood to the head, feel of hot flush, cheilitis, numbness of the tongue

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

Symptoms' name	Symptoms
Pseudoaldosteronism, myopathy	In addition to listlessness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually worsen.

- Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for about 1 month. Take this leaflet with you.
- If you take this medicine regularly for a long periods, consult a physician, pharmacist or registered distributor.

INDICATIONS

Following symptoms in persons with rigor, fever, headache, and tension in the nuchal, shoulder and back:

Shoulder stiffness, neuralgia in the scapular region, and articular rheumatism in the upper body.

DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or after meals.

Age	One dosage
Adult(15 years and over)	1 - 3 packets
Less than 15 years	Do not use

INGREDIENTS

9 packets (0.8g/packet) of **Sanwaron C Granules** contain 3.375g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Pueraria Root4.500g
JP Ephedra Herb3.375g
JP Ginger3.375g
JP Jujube3.375g
JP Atractylodes Lancea Rhizome.....	3.375g
JP Cinnamon Bark2.250g
JP Peony Root2.250g
JP Glycyrrhiza2.250g

The following powder are mixed with this extract in addition.

JP Powdered Processed Aconite Root.....	1.125g
---	--------

Inactive ingredients

JP Lactose Hydrate, JP Corn Starch, JP Calcium Stearate.
(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- Keep all medication out of the reach of children.
- Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

CONTACT INFORMATION

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Tel : 03-3834-2171

(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.

Manufactured and Distributed by:

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.

6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan