

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 107

# サンワロン C

かっこん かじゅつぶ とう  
葛根加朮附湯による

サンワロン C は、漢方処方「葛根加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
* その 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

#### 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15才以上)	6錠
15才 未 満	服用しないこと

## 成 分

本品1日量 …………… 18錠 (1錠 0.3g) 中  
サンワロンC水製エキス …………… 2.7g

カッコン……………	3.6g	ビャクジュツ……………	2.7g
マ オ ウ……………	2.7g	ケ イ ヒ……………	1.8g
ショウキョウ……………	2.7g	シャクヤク……………	1.8g
タイソウ……………	2.7g	カンゾウ……………	1.8g

加工ブシ末 …………… 0.9g

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- \* (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
TEL 03-3834-2171 (代)  
(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

## 適応症

悪感発熱して、頭痛があり項部肩背部に緊張感のあるもの肩こり。肩甲部の神経痛。上半身の関節リウマチ。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1