

## サンワロンK 顆粒

けいしかじゅうぶとう  
桂枝加朮附湯による

サンワロンK顆粒は、漢方処方「桂枝加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状                 |
|-------|---------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ           |
| そ の 他 | 動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

## 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人(15才以上) | 1~2包    |
| 15才未満     | 服用しないこと |

## 成 分

本品1日量 …… 6包(1包0.75g) 中  
サンワロンK水製エキス …… 2.4g

|                |                |
|----------------|----------------|
| ケイヒ …… 2.4g    | ショウキョウ …… 0.6g |
| シヤクヤク …… 2.4g  | カンゾウ …… 1.2g   |
| タイソウ …… 2.4g   | ソウジュツ …… 2.4g  |
| 上記の生薬より抽出したエキス |                |

加工ブシ末 …… 0.6g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Caを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせをお願いします。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

## 適応症

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症:

関節痛、神経痛



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1