

# サンワロン M 顆粒

ま お う ふ し さい し ん と う  
麻黄附子細辛湯 による

サンワロンM顆粒は、漢方処方「麻黄附子細辛湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (6) 発汗傾向の著しい人。
- (7) 高齢者。
- (8) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (9) 次の症状のある人。  
排尿困難
- (10) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身倦怠感、発熱、動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

#### 3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 ～ 2 包
15才 未 満	服用しないこと

## 成 分

本品1日量 …………… 6包（1包 0.75g）中  
サンワロンM水製エキス …… 1.5g

マ オ ウ ……………	6.0g
サイ シ ン ……………	4.5g
*上記の生薬より抽出したエキス	

加工ブシ末 …………… 1.5g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Caを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- \* (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田6-6-1  
TEL 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

## 適応症

体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：

感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.  
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 108

Revised : October 2017

Category 2 OTC medicines

## Sanwaron M Granules

<Maobushisaishinto>

This product is easy to take, granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called "maobushisaishinto".

### CAUTION FOR USE

#### Who should seek consultation

- The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.
  - Persons undergoing medical treatment from a physician.
  - Pregnant women or women suspected of being pregnant.
  - Persons who is physically weak (declining of strength or constitutional weakness).
  - Persons who have gastrointestinal weakness.
  - Persons with a tendency towards hot flush, red face and strong constitution.
  - Persons with excessive sweating.
  - Elderly persons.
  - Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.
  - Persons with the following symptoms: difficulty in urination
  - Persons diagnosed as having the following: hypertension, heart disease, kidney disease, thyroid disease.

- The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching
Gastrointestinal system	Nausea, vomiting, loss of appetite, gastric distress
Others	Excessive sweating, whole-body tiredness, fever, palpitation, rush of blood to the head, feel of hot flush, cheilitis, numbness of the tongue

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

Symptoms' name	Symptoms
Hepatic function failure	Following symptoms appear: fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and white of eyes), brown urine, whole-body tiredness, loss of appetite.

- Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for 5 to 6 days if you take this medicine for common cold). Take this leaflet with you.

### INDICATIONS

Following symptoms in persons with poor physical strength who have coldness in hands and feet, and/or sometimes feel chill:

Common cold, allergic rhinitis, bronchitis, bronchial asthma, neuralgia.

### DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or between meals.

Age	One dosage
Adult (15 years and over)	1 - 2 packets
Less than 15 years	Do not use

### INGREDIENTS

6 packets (0.75g/packet) of **Sanwaron M Granules** contain 1.5g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Ephedra Herb .....6.0g  
JP Asiasarum Root .....4.5g

The following powder are mixed with this extract in addition.  
JP Powdered Processed Aconite Root.....1.5g

Inactive ingredients

JP Corn Starch, JP Lactose Hydrate, JP Calcium Stearate.  
(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

### PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- Keep all medication out of the reach of children.
- Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

### CONTACT INFORMATION

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center  
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  
Tel : 03-3834-2171  
(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.

**Manufactured and Distributed by:**

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.

6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan