

サンワロン S 顆粒

しんぶとう
真武湯による

サンワロン S 顆粒は、漢方処方「真武湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

新陳代謝機能の衰退により四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく尿量減少して下痢し易く動悸やめまいを伴うもの。
胃腸虚弱症・慢性腸カタル・慢性腎炎

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171 (代)

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1~2 包
15才 未 満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …………… 6包(1包0.75g) 中

サンワロン S 水製エキス …………… 2.4g

ブクリョウ …………… 3.0g	ショウキョウ …………… 0.6g
シヤクヤク …………… 1.8g	ソウジュツ …………… 1.8g

加工ブシ末 …………… 0.6g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有する。



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。