

# サンワロン顆粒

はち み し おうがん  
八味地黄丸による

サンワロン顆粒は、漢方処方「八味地黄丸」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

#### 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1~2包
15才未満	服用しないこと

## 成 分

本品1日量 …………… 6包(1包0.75g)中  
サンワロン水製エキス …………… 1.5g

ジ オ ウ …………… 1.80g	タ ク シ ャ …………… 1.05g
サ ン ヤ ク …………… 1.05g	ボ タ ン ビ …………… 1.05g
サ ン シ ュ ユ …………… 1.05g	ケ イ ヒ …………… 0.60g
ブ ク リ ョ ウ …………… 1.05g	

\*上記の生薬より抽出したエキス

加工ブシ末 …………… 1.5g

添加物として乳糖、トモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- \* (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田6-6-1  
TEL 03-3834-2171 (代)  
(月~金曜日 10:00~17:00 但し祝日を除く)

## 適応症

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.  
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 104

Revised : January 2018

Category 2 OTC medicines

## *Sanwaron* Granules <Hachimijiogan>

This product is easy to take, granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called "hachimijiogan".

### CAUTION FOR USE

#### To be avoided

Failure to observe the following may result in the symptoms worsening or the occurrence of adverse reactions/accidents.

Following persons should not take this medicine.

- (1) Persons with weak stomach and intestine.
- (2) Persons who have a tendency to diarrhea.

#### Who should seek consultation

1. The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.

- (1) Persons undergoing medical treatment from a physician.
- (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
- (3) Red faced persons with hot flashes who have fulfilling physical performance.
- (4) Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.

2. The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching
Gastrointestinal system	Loss of appetite, gastric distress, abdominal pain
Others	Palpitation, rush of blood to the head, cheilitis, numbness of the tongue

3. A following symptom may appear after taking this medicine. If the symptom continues or worsen, consult a physician, pharmacist or registered distributor. Take this leaflet with you: diarrhea

4. Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for about 1 month. Take this leaflet with you.

### INDICATIONS

Following symptoms in persons with moderate or poor physical strength who tend to get tired easily, tend to be sensitive to cold in hands and feet, have decreased or increased urine volume, and/or sometimes have dry mouth:

Leg pain, lower back pain, numbness, blurred eye in elderly, itching, difficulty in urination, residual urine, nocturia, frequent urination, edema associated symptoms of hypertension (stiff shoulder, heavy head, ear noise), and mild incontinence.

### DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or between meals.

Age	One dosage
Adult(15 years and over)	1 - 2 packets
Less than 15 years	Do not use

### INGREDIENTS

6 packets (0.75g/packet) of **Sanwaron Granules** contain 1.5g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Rehmannia Root	1.80g
JP Dioscorea Rhizome	1.05g
JP Cornus Fruit	1.05g
JP Poria Sclerotium	1.05g
JP Alisma Tuber	1.05g
JP Moutan Bark	1.05g
JP Cinnamon Bark	0.60g

The following powder are mixed with this extract in addition.

JP Powdered Processed Aconite Root.....1.5g

Inactive ingredients

JP Lactose Hydrate, JP Corn Starch, JP Calcium Stearate.

(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

### PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- (1) Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- (2) Keep all medication out of the reach of children.
- (3) Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- (4) When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

## **CONTACT INFORMATION**

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center  
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  
Tel : 03-3834-2171  
(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.
--

## **Manufactured and Distributed by:**

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.  
6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan