

しゃくやくかん ぞうとう
サンワ 芍薬甘草湯 エキス細粒

サンワ芍薬甘草湯エキス細粒は、漢方処方「芍薬甘草湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
次の診断を受けた人。
心臓病
2. 症状があるときのみでの服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 次の症状のある人。
むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：

こむらえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年令	1回量
大人(15才以上)	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
2才～3才	0.6 g
2才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- * (1) 添付のサジすりきり1杯が約2gです。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分

本品1日量 …………… 6 g 中
芍薬甘草湯エキス (3/5量) …… 1.0 g

シヤクヤク ……………	3.0 g
カンゾウ ……………	3.0 g
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者くすり相談室 TEL 0570-095770

10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1