

# とう きしゃくやく さんりょう 当帰芍薬散料 A エキス細粒「分包」 三和生薬

当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「当帰芍薬散」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成 分

本品1日量 …………… 3包（1包2.0g）中  
当帰芍薬散エキス（4/5量）…………… 3.8g

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| トウキ …………… 2.4g  | ブクリョウ …… 3.2g |
| センキュウ …… 2.4g   | ビャクジュツ … 3.2g |
| シヤクヤク …… 3.2g   | タクシャ …… 3.2g  |
| *上記の生薬より抽出したエキス |               |

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- \* (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

## 適応症

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田6-6-1  
TEL 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 1 包     |
| 7才～14才    | 2/3 包   |
| 4才～6才     | 1/2 包   |
| 4才未満      | 服用しないこと |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1