

とう きしゃくやく さんりょう 当帰芍薬散料 A エキス細粒「分包」 三和生薬

当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「当帰芍薬散」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品1日量 …………… 3包（1包2.0g）中
当帰芍薬散エキス（4/5量）…………… 3.8g

トウキ …………… 2.4g	ブクリョウ …… 3.2g
センキュウ …… 2.4g	ビヤクジュツ … 3.2g
シヤクヤク …… 3.2g	タクシャ …… 3.2g
*上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- * (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

適応症

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田6-6-1
TEL 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3包
4才～6才	1/2包
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 317

Revised : July 2017

Category 2 OTC medicines

Tokishakuyakusanryo A Extract Fine Granules [packets] SANWASHOYAKU

This product is easy to take, fine granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called "tokishakuyakusan".

CAUTION FOR USE

Who should seek consultation

- The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.
 - Persons undergoing medical treatment from a physician.
 - Persons who have gastrointestinal weakness.
 - Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.
- The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching
Gastrointestinal system	Loss of appetite, gastric distress

- Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for about 1 month. Take this leaflet with you.

INDICATIONS

Following symptoms in persons with poor physical strength who tend to be sensitive to cold, tend to get tired easily, have an anemic tendency, and sometimes complaint lower abdominal pain, heavy head, dizziness, stiff shoulder, ear noise, and/or palpitation :

Menstrual irregularity, menstrual disorders, menstrual pain, menopausal disorders, disorders before and after child birth or due to abortion (anemia, fatigue/malaise, dizziness, edema), dizziness, syncope, heavy head, stiff shoulder, lower back pain, over-sensitiveness to cold in the lower half of the body, chilblains, edema, spot of the skin, and ear noise.

DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or between meals.

Age	One dosage
Adult(15 years and over)	1 packet
7 - 14 years	2/3 packet
4 - 6 years	1/2 packet
Less than 4 years	Do not use

<Cautions >

This medication should be given to children only under adult supervision

INGREDIENTS

3 packets (2.0g/packet) of **Tokishakuyakusanryo A Extract Fine Granules** contain 3.8g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Japanese Angelica Root2.4g
JP Cnidium Rhizome2.4g
JP peony Root3.2g
JP Poria Sclerotium3.2g
JP Atractylodes Rhizome3.2g
JP Alisma Tuber3.2g

Inactive ingredients

JP Lactose Hydrate, JP Microcrystalline Cellulose, Partly Pregelatinized Starch, JP Calcium Stearate, JP Light Anhydrous Silicic Acid.

(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- Keep all medication out of the reach of children.
- Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

CONTACT INFORMATION

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Tel : 03-3834-2171
(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.
--

Manufactured and Distributed by:

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.
6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan