

とう き しゃくやく さん りょう
当帰芍薬散料 A エキス細粒「分包」三和生薬

当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「当帰芍薬散」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品1日量 3包（1包2.0 g）中
 当帰芍薬散エキス（4/5量） 3.8 g

$\left\{ \begin{array}{l} \text{トウキ} \dots 2.4 \text{ g} \\ \text{センキュウ} \dots 2.4 \text{ g} \\ \text{シャクヤク} \dots 3.2 \text{ g} \end{array} \right.$	$\begin{array}{l} \text{ブクリヨウ} \dots 3.2 \text{ g} \\ \text{ビヤクジユツ} \dots 3.2 \text{ g} \\ \text{タクシャ} \dots 3.2 \text{ g} \end{array}$
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

適応症

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月經異常、月經痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4才未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1